
BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 113 du 04/07/90





E LAW

Stade : 70 cm à début sortie des panicules mâles.

Pyrale

Situation

pyrale poursuit vol de Le se modérément. Etat des captures au piège sexuel:

LIEU	Captures cumulées au 3/07
10	
Charny le Bachot	25
Planty	4
Rumilly les V.	0
Villehardouin	11
51	
Unchair	14
Muizon	9

Quelques nouvelles pontes fraîches (1 à 2 pontes pour 50 pieds) sont observées dans l'Aube, pas de ponte observée dans la Marne (Tardenois).

<u>Préconisation</u>

REIMS

10

==> Si vous effectuez un traitement terrestre avec un insecticide liquide,

la période optimale de traitement est fin de semaine. Dans ce cas, attention pullulations ultérieures pucerons. Observez vos propres parcelles d'une décider telle avant intervention (évolution des pontes).

d'emploi Sinon, (cas d'insecticides microgranulés), réaliser l'intervention courant de la semaine prochaine (50% de panicules mâles visibles au fond du cornet).

Remarque : Eviter les traitements systématiques car dans de nombreux secteurs, il est très peu probable que le nombre de pontes atteigne le seuil de nuisibilité (15 pontes pour 100 pieds).

Pucerons

Situation

Les populations sont faibles moyennes, généralement constituées d'une majorité d'ailés de Rhopasosiphum padi. Les auxiliaires sont déjà bien installés et actifs.

Préconisation

Toute intervention immédiate inutile mais surveiller l'évolution des populations.

> Ministère de l'Agriculture Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux 62, avenue Nationale - La Neuvillette

B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX 1 Téléphone: 26.09.06.43

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL: 200 F

13. 工 正

Maladies

Situation

Le **piétin-verse** se manifeste dans certaines parcelles mal protégées sous forme d'épis blancs disséminés dans la culture. Peu de **fusariose**.

L'oïdium est fortement présent sur épis dans des situations mal contrôlées.

La **septoriose** est parfois présente sur épis (confirmation au laboratoire en cours).

Préconisation

Fin de toutes les interventions.

BETTERAVE

Pucerons

Situation

On retrouve des colonies de pucerons aptères dans le coeur noirs betteraves, en particulier dans mesure où Marne. Dans la contaminations primaires ont été bien maîtrisées (aucun symptôme de jaunisse visible), les risques de dissémination du virus (foyers secondaires) sont très faibles. De plus, la faune auxiliaire est très active.

Préconisation

Une nouvelle intervention ne se justifie plus.

T O U R M E S O L

Capitule de 5 à 8 cm à début de floraison.

Mildiou

Situation

Deux nouveaux cas de mildiou ont été détectés dans l'Aube à Longchamp/Onjon et à Clairvaux.

Préconisation

Seul le traitement de semences contre le mildiou (rendu obligatoire par arrêté) est efficace.

Si vous découvrez des taches suspectes, n'hésitez pas à nous contacter au 26.09.06.43.

POMME DE TERRE

Mildiou

Situation

Pas de tache de mildiou observée en culture.

Des nouvelles contaminations ont été enregistrées depuis le dernier bulletin:

- les 28 et 29/06 dans de nombreux secteurs de la Marne et de l'Aube.
- les 02 ou 03/07 dans la plupart des parcelles suivies.

Les sorties de taches ont lieu ces jours-ci.

<u>Préconisation</u>

Il y a lieu de renouveler la protection dès à présent avec un contact si ce n'est déjà fait.

Dans la mesure où vous n'étiez pas protégé les 2-3 et(ou) 4 juillet, préférez un produit à action pénétrante.

Que vous ayez un Boxtel, un automate d'appel ou simplement un minitel, vous pouvez vous abonner à l'édition "MILDIOU POMME DE TERRE" télématique pour 100 F.

